

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD 01.01.2021

NAZWA PREPARATU	STĘŻENIE	ZAKRES BIOBÓJCZOŚCI	CZAS DEZYNFEKCJI	OBSZAR ZASTOSOWANIA	UWAGI
DESAM EFEKT	0,25 %	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HBV/HCV/HIV) Tbc	15 min	Duże powierzchnie Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni i sprzętu medycznego	Silnie zabrudzone powierzchnie i przyrządy należy wstępnie oczyścić mechanicznie a następnie zdezynfekować
	0,5%	j.w. + rotawirusy			
DESAM EXTRA	0,5 %	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HBV/HCV/HIV), Tbc	15 min	Duże powierzchnie Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni i sprzętu medycznego	Silnie zabrudzone powierzchnie i przyrządy należy wstępnie oczyścić mechanicznie a następnie zdezynfekować
	1%	j.w. + rotawirusy	5 min		
INCIDIN FOAM	Gotowy do użycia pianka	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	1 min	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu nieodpornych na działanie alkoholi	Nanieść preparat na powierzchnię aż do całkowitego pokrycia i pozostawić do wyschnięcia. Preferowana forma dezynfekcji przez przecieranie
DESPREJ	Gotowy do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	1 min	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu odpornych na działanie alkoholi	Nanieść preparat na powierzchnię aż do całkowitego zwilżenia i pozostawić do wyschnięcia. Preferowana forma dezynfekcji przez przecieranie. Metodę natryskową wykorzystujemy tylko do trudnodostępnych miejsc
DESAM SPREY	Gotowy do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	30 sek.	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu odpornych na działanie alkoholi	Środek należy rozprowadzić przy pomocy husteczek jednorazowych tak, aby dokładnie zwilżyć całą powierzchnię. Metodę natryskową wykorzystujemy tylko do trudnodostępnych miejsc

MELISEPTOL CHUSTECZKI	Gotowe do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	1 min	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu odpornych na działanie alkoholi	Zwilżyć całą dezynfekowaną powierzchnię przez przetarcie i pozostawić do wyschnięcia
MEDICARINA/ CHLORAMIX	0,36 %	B, F, V, TBC	15 min	Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu przez zanurzenie bez zanieczyszczenia organicznego	Materiał organiczny zebrać ligniną/ ręcznikiem. Pokryć dezynfekowaną powierzchnię przygotowanym roztworem. Po dezynfekcji wywietrzyć pomieszczenie
	1,80 %	B, F, V, TBC	15 min	Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu przy zabrudzeniu krwią, wydaliniami, wydzielinami i Clostridium difficile	
PREPARATY DO DEZYNFEKCJI RĄK					
SPITADERM	Gotowy do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	30 sek	Higieniczna dezynfekcja rąk	Nanieść na suchą skórę rąk , dezynfekować według procedury
SPIRIGEL	Gotowy do użycia preparat w żelu	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	15 – 30 sek	Higieniczna dezynfekcja rąk	Nanieść na suchą skórę rąk , dezynfekować według procedury
AHD 1000	Gotowy do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	30 sek	Higieniczna dezynfekcja rąk	Nanieść na suchą skórę rąk , dezynfekować według procedury
DESDERMAN PURE	Gotowy do użycia	Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy osłonowe i bezosłonkowe, Tbc	30 sek	Higieniczna dezynfekcja rąk	Nanieść na suchą skórę rąk, dezynfekować według procedury

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH					
SKINSEPT	Gotowy do użycia	x	15sek – 1 min	Odkazanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi – 15 sek Odkazanie skóry przed punkcją – 1 min	Spryskać obszar skóry i pozostawić do wyschnięcia
MED. HYGIENIC	Gotowy do użycia gazik	x	15 sek -1 min	Odkazanie skóry przed iniekcjami , pobraniem krwi	Zwilżyć dezynfekowany obszar skóry i odczekać zalecany czas dezynfekcji
OCTENISEPT PLYN	Gotowy do użycia	x	1 min	Profilaktyka i leczenie zakażeń ran, błon śluzowych	Przemyć ranę , błonę śluzową .
OCTENILIN GEL	Gotowy do użycia	X	Nałożony na ranę działa do 4 dni	Nawilżanie i oczyszczenie skolonizowanych, zakażonych ran .	Preparat zachowuje swoje właściwości 4 tygodnie po otwarciu